



Blue-gray Tanager (*Thraupis episcopus*)

Photography and Edition by Ronald Vargas C.

Order: Passeriformes

Family: Thraupidae

The Blue-gray Tanager is a well-known bird in Costa Rica, since it is found in different habitats including busy urban areas, but most frequent in cultivated areas, bushes on the sides of roads and river edges, groves, gallery forests, gardens, among other human created habitats.

More than 14 varieties have been described throughout its geographical distribution from Mexico to most of the Amazon basin of Brazil, varying mostly on the different shades of blue in the body, especially on its shoulders.

T. episcopus feeds mostly on fruits, but occasionally hunts insects and feed nectar from some flowers.

The female generally lays 2 eggs, hatching in about 14 days. The chicks will remain in the nest for about 17 more days and then they will leave. Some nests are parasitized by another bird of the genus *Molothrus* (Cowbird).

Due to its great and healthy populations, the IUCN does not consider this bird in danger.

Viudita (*Thraupis episcopus*)

Fotografía y edición por Ronald Vargas C.

Orden: Passeriformes

Familia: Thraupidae

La viudita es un ave bien conocida en Costa Rica, ya que se le encuentra en diferentes hábitats incluyendo zonas urbanas transitadas, pero es más frecuente en zonas cultivadas, matorrales a los lados de carreteras y bordes de ríos, arboledas, bosques de galerías, jardines, entre otros hábitats creados por el hombre.

Se han descrito más de 14 variedades a lo largo de su distribución geográfica, que va desde México hasta la mayoría de la cuenca del Amazonas en Brasil, variando más que todo de las diferentes tonalidades de azul de sus plumas., sobre todo en sus hombros. *T. episcopus* se alimenta mayormente

de frutas, pero ocasionalmente caza insectos y liba néctar de algunas flores.

La hembra pone generalmente 2 huevos que empollará por aproximadamente 14 días, y los polluelos se mantienen en el nido por alrededor de 17 días más. Algunos nidos son parasitados por otra ave del género *Molothrus* (Tordo).

Por sus poblaciones altas y sanas, la UICN no considera esta ave en peligro.



Clay-colored thrush (*Turdus grayi*)

Photography and Editing by Ronald Vargas C.

Order: Passeriformes

Family: Turdidae

On January 3, 1977, the Clay-colored thrush was decreed the national bird of Costa Rica, this decision was based on the melodiousness of its song that is more frequent at the beginning of the rainy season, but it was also chosen for being a bird that has accompanied our peasants throughout history in their work fields and around their homes, where it often nests. Currently, with the transformation of once rural areas to cities, this bird has adapted and is often seen and heard in populated areas such as the capital city San José. This bird has been so familiar to Costa Ricans that it has been mentioned in various stories, poems, and songs.

Its main diet is fruit-based, but it is seen on the ground digging and hunting insects and worms, especially at the nesting season to feed its young.

Its geographical distribution goes from Texas (where its range is growing more and more) to Colombia. Both the female and the male have a yellowish brown color with lighter tones in the ventral area and throat. Its average size is around 10 inches.

Yigüirro (*Turdus grayi*)

Fotografía y edición por Ronald Vargas C.

Orden: Passeriformes

Familia: Turdidae

El 3 de enero de 1977 el Yigüirro fue decretado ave nacional de Costa Rica, esta decisión se basó en lo melodioso de su canto que es más frecuente a inicios de la época lluviosa, pero también fue escogido por ser un ave que ha acompañado a nuestros campesinos a lo largo de la historia en sus campos de trabajo y los alrededores de sus casas, donde muchas veces suelen anidar, Actualmente, con los cambios de zonas rurales en urbes, este ave ha sabido adaptarse y suele verse y escucharse en áreas populosas como nuestra capital San José, si visita el parque central es muy probable que lo escuche o lo vea. Esta ave ha sido tan familiar para los costarricenses, que se ha mencionado en varios cuentos, poesías y canciones.

Su dieta principal es a base de frutos, pero se les ve en el suelo escarbando y cazando insectos y lombrices, sobre todo en la época de anidación para alimentar a sus pichones.

Su distribución geográfica va desde Texas (donde cada vez amplia mas su rango) hasta Colombia. Tanto la hembra como el macho tienen un color pardo amarillento con tonos más claros en la zona ventral y la garganta. Su tamaño promedio es de alrededor de 25 cm.



Margay (*Leopardus wiedii*)

Photography by Katherine Ulate

Editing by Ronald Vargas C.

Order: Carnivora

Family: Felidae

The Margay is one of the 6 species of felines existing in Costa Rica, this being the second smallest on this list. It is nocturnal, solitary and hunts small prey such as rodents, birds, insects, kinkajous, lizards, monkeys and so forth. It has large eyes and its tail is quite long and adapted to climb trees, where it usually sleeps during the day.

Its geographical distribution goes from Mexico to southern Argentina, but there was a record in Texas. It frequents mature and secondary forests, gallery forests and in rural areas it usually attacks poultry and pets.

The IUCN put it on the red list, due to illegal hunting to obtain their fur or keep them as pets and because it is considered an enemy of farmers. Its greatest threat is deforestation and the disappearance

of natural habitat.

A relevant characteristic of *L. wiedii* is the ability to rotate its ankles to descend from the trees upside down. Only this feline and the clouded panther (*Neofelis nebulosa*) have this ability.

Caucel (*Leopardus wiedii*)

Fotografía por Katherine Ulate

Edición por Ronald Vargas C.

Orden: Carnivora

Familia: Felidae

El Caucel es una de las 6 especies de felinos existentes en Costa Rica, siendo este el segundo de menor tamaño de esta lista. Es de hábitos nocturnos, solitario y caza presas pequeñas como roedores, aves, insectos, martillas, lagartijas, monos, etc. Tiene ojos grandes y su cola es bastante larga y adaptada para subir a los árboles, donde suele dormir durante el día.

Su distribución geográfica va desde México hasta el sur de Argentina, pero hubo un registro en Texas. Frecuenta bosques maduros, secundarios, bosques de galería y en áreas rurales suele atacar aves de corral y mascotas.

La IUCN lo puso en lista roja, debido a la cacería ilegal para obtener su piel o tenerlos como mascotas y por ser considerado un enemigo de los finqueros, pero su mayor amenaza es la deforestación y desaparición de su hábitat natural.

Una característica relevante de *L. wiedii* es la capacidad de rotar sus tobillos para bajar de los árboles cabeza abajo. Solo este felino y la pantera nebulosa (*Neofelis nebulosa*) tienen esta habilidad.